

Le peeling chimique est une procédure médicale consistant à provoquer une régénération cutanée accélérée et contrôlée grâce à l'application d'agents chimiques exfoliants.

	Mesopeel MD Melanostop Tranex	Mesopeel MD Melanoplus Touch	Mesopeel MD Oxyage
Indications	PEELING DÉPIGMENTANT <ul style="list-style-type: none"> - Teint terne ou irrégulier - Ephélides : taches de rousseur - Entretien Dermamelan 	PEELING DÉPIGMENTANT Lentigos : hyperpigmentation maculeuse, plane ou légèrement surélevée, de 1 à 3 mm de diamètre, isolée ou multiple, due à l'exposition solaire (lentigo solaire) ou au vieillissement (lentigo sénile)	PEELING RETEXTURANT <ul style="list-style-type: none"> - Vieillesse cutané - Pores dilatés
Composition	Acide salicylique 20%	TCA 20% (acide trichloroacétique)	TCA 30%
Phototypes	I à IV (peau non bronzée)		
Nombre de séances	3 à 5	1 à 5	3 à 5
Intervalle	2 semaines	2 à 3 semaines	2 à 3 semaines
Entretien	2 fois par an (tous les 6 mois)		
Contre-indications	<ul style="list-style-type: none"> - Grossesse / allaitement - Maladie auto-immune / pathologie immunodépressive - Cancer en cours - Antécédent de cancer de la peau - Grain de beauté pré-cancéreux ou suspect / lésion suspecte - Pathologie dermatologique - Chirurgie dermatologique récente - Troubles de la cicatrisation : chéloïde / cicatrice hypertrophique - Troubles endocriniens : diabète déséquilibré - Troubles psychiatriques sévères - Pathologie sévère (notamment cardiaque) - Herpès du visage - Psoriasis / eczéma sur la zone à traiter - Peau irritée, lésée ou infectée sur la zone à traiter - Tatouage / maquillage permanent ou semi-permanent - Prise de rétinoïdes par voie orale → intervalle dernière prise de Roaccutane / peeling = 6 mois - Allergie à l'un des composants du peeling 		
Consignes pré-traitement	<ul style="list-style-type: none"> - Ne pas faire de peeling professionnel 1 mois avant le peeling - Ne pas utiliser de substances abrasives ou irritantes 5 jours avant le peeling - Ne pas teindre, décolorer, épiler (y compris au laser) ou raser la zone à traiter - Bien s'hydrater avant la séance (1,5 à 2L d'eau/jour) - Appliquer quotidiennement une crème hydratante 		
Consignes post-traitement	<ul style="list-style-type: none"> - Durant la desquamation (2 semaines) : appliquer une crème réparatrice 2x/j - En cas de desquamation importante et/ou de croûtes : appliquer de la vaseline liquide 2x/j - Ne pas frotter ni gratter la zone traitée - Ne pas retirer la peau qui pèle ni les croûtes - Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels durant 2 mois - Appliquer une crème solaire toutes les 2 heures (minimum 4x/j) - Éviter de pratiquer une activité physique durant 48h - Éviter de se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna durant 48h - Ne pas faire d'injection d'acide hyaluronique sur la zone traitée durant 1 semaine - Ne pas faire de traitement au laser sur la zone traitée durant 15 jours - Ne pas faire de tatouage sur la zone traitée durant 30 jours - MELANOSTOP TRANEX / OXYAGE : Éviter les traitements aux rétinoïdes 		
Effets indésirables	<ul style="list-style-type: none"> - Légers picotements / légères démangeaisons (pendant le soin) - Erythème (plus de 72h) - Desquamation - Oedème - Croûtes - Modifications de texture - Cicatrice hypertrophique - HPPI / hypopigmentation 		
Conservation	6 mois après ouverture (le produit peut changer de couleur au cours de sa durée de validité)		

MESOPEEL MD MELANOSTOP TRANEX

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Porter des gants
- Nettoyer la zone à traiter avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline : grains de beauté, verrues, coins externes et internes des yeux, ailes du nez, commissures et muqueuse des lèvres et lobes des oreilles
- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 4 ml de Mesopeel MD Melanostop Tranex dans 2 godets en verre (1 godet/couche)

Dosage par couche : **2 ml**
 Temps de pause de chaque couche : **5 minutes***
 Nombre de couches : **2**

- Appliquer chaque couche de peeling au **pinceau**, uniformément et rapidement : front, joues, menton, zone péri-buccale puis nez
Frotter ou exercer une pression permet d'augmenter la profondeur de l'exfoliation
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **5 minutes après l'application de la dernière couche** : Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse imbibée d'eau puis sécher
- Appliquer une crème solaire réparatrice

MESOPEEL MD MELANOPLUS TOUCH

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Porter des gants
- Nettoyer la zone à traiter avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline
- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 1 à 3 ml de Mesopeel MD Melanoplus Touch dans 2 godets en verre (1 godet/couche)

Dosage par couche : **0,5 à 1,5 ml**
 Temps de pause de chaque couche : **5 minutes***
 Nombre de couches : **2 (3 maximum)**
 End point : **apparition de givre blanc (frosting)**

- Appliquer chaque couche de peeling avec un **coton-tige** ou une **compresse**, uniformément et de manière localisée sur la zone à traiter
Frotter ou exercer une pression permet d'augmenter la profondeur du peeling
- Renouveler l'application **uniquement** sur les zones qui n'ont pas givrées après 5 minutes
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **Dès apparition du givre ou 5 minutes après l'application de la dernière couche** : Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse humide
- Appliquer une crème solaire réparatrice

MESOPEEL MD OXYAGE

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Porter des **gants en nitrile**
- Nettoyer la zone à traiter avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline
- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 2 ml de Mesopeel MD Oxyage dans 1 godet en verre

Dosage par couche : **2 ml**
 Nombre de couches : **1 (2 maximum)**
 Temps de pause de chaque couche : **3 minutes***
 End point : **apparition de givre blanc (frosting)**

- Appliquer chaque couche de peeling **au doigt**, en fine couche, uniformément et rapidement : front, joues, menton, zone péri-buccale puis nez
Frotter ou exercer une pression permet d'augmenter la profondeur de l'exfoliation
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante ou en cas d'apparition de vésicules ou d'un érythème localisé, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse pour neutraliser le peeling

- **3 minutes après l'application de la dernière couche** : Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse imbibée d'eau puis sécher
- Appliquer une crème solaire réparatrice

* débiter le chronomètre dès application

PEELINGS MESOPEEL

MYLASER

* débuter le chronomètre dès application