

| SIGNES CLINIQUES   | CONDUITE À TENIR  | CONDUITE À TENIR SI AGGRAVATION OU ASSOCIATION D'UN AUTRE SIGNE CLINIQUE   |
|--|---|--|
| <p>URTICAIRE</p> <p>OEDÈME</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Donner immédiatement un antihistaminique au patient : 1 comprimé Aeries 5mg</li> <li>• Surveiller le patient durant 30 minutes</li> <li>• Prendre sa tension artérielle et son pouls avant son départ</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faire l'injection d'Anapen 300µg/0,3ml</b> : Appuyer fermement la seringue <b>sur la face externe de la cuisse</b> puis appuyer sur le déclencheur de façon à entendre un « clic ». L'injection peut être pratiquée à travers des vêtements légers ou un jean. Maintenir en position <b>pendant 10 secondes</b>. Retirer lentement la seringue puis masser doucement le site d'injection.</li> <li>• <b>Contactez immédiatement le 15 (ou le 112)</b></li> <li>• Maintenir le patient allongé et lui lever les jambes</li> <li>• Poser une voie veineuse périphérique</li> <li>• Prendre sa tension artérielle et son pouls</li> </ul> |
| <p>GÊNE RESPIRATOIRE</p> <p>URTICAIRE QUI S'ÉTEND RAPIDEMENT</p> <p>DOULEURS ABDOMINALES</p> <p>VOMISSEMENT</p> <p>PÂLEUR</p> <p>SENSATION DE MALAISE</p> <p>PERTE DE CONNAISSANCE</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Faire l'injection d'Anapen 300µg/0,3ml</b> : Appuyer fermement la seringue <b>sur la face externe de la cuisse</b>, puis appuyer sur le déclencheur de façon à entendre un « clic ». L'injection peut être pratiquée à travers des vêtements légers ou un jean. Maintenir en position <b>pendant 10 secondes</b>. Retirer lentement la seringue puis masser doucement le site d'injection.</li> <li>• <b>Contactez immédiatement le 15 (ou le 112)</b></li> <li>• Maintenir le patient allongé et lui lever les jambes</li> <li>• Poser une voie veineuse périphérique</li> <li>• Prendre sa tension artérielle et son pouls</li> </ul> |  |