

Le protocole Periocular associe l'application d'un peeling chimique superficiel Mesopeel MD Periocular et la mésothérapie de deux produits de comblement anti-âge Mesohyal Argibenone (réparation/restructuration) et Mesohyal Melilot (hydratation/nutrition).

	Mesopeel MD Periocular	Mesohyal Argibenone	Mesohyal Melilot
Composition	30% Acide glycolique 14% Acide salicylique	Acide hyaluronique Idébénone Hexapeptide	Acide hyaluronique Mélilot Troxérutine
Indications	• Hyperpigmentations péri-oculaires pigmentaires (couleur marron) ou vasculaires (couleur bleue, rose ou violette) • Signes du vieillissement de la zone péri-oculaire : rides des paupières (supérieures et inférieures) et des coins externes de l'oeil (pattes d'oie), hyperpigmentations, cernes, relâchement, perte de densité des tissus, perte d'éclat		
Phototypes	I à IV		
Nombre de séances	3 à 5		
Intervalle	2 semaines		
Entretien	2 fois par an (tous les 6 mois)		
Contre-indications	- Grossesse / allaitement - Maladie auto-immune / pathologie immunodépressive - Cancer en cours - Antécédent de cancer de la peau - Grain de beauté pré-cancéreux ou suspect / lésion suspecte - Pathologie dermatologique - Chirurgie dermatologique récente - Troubles de la cicatrisation : chéloïde / cicatrice hypertrophique - Troubles endocriniens : diabète déséquilibré - Troubles psychiatriques sévères - Pathologie sévère (notamment cardiaque) - Herpès du visage - Psoriasis / eczéma sur la zone à traiter - Peau irritée, lésée ou infectée sur la zone à traiter - Tatouage / maquillage permanent ou semi-permanent - Zones déjà traitées avec du silicone - Prise de rétinoïdes par voie orale → intervalle dernière prise de Roaccutane / peeling = 6 mois - Prise de médicaments AINS, corticoïdes et anticoagulants → intervalle dernière prise d'Aspirine / mésothérapie = 7 jours		
Consignes pré-traitement	- Ne pas faire de peeling professionnel 1 mois avant le peeling - Ne pas utiliser de substances abrasives ou irritantes 5 jours avant le peeling - Ne pas teindre, décolorer, épiler (y compris au laser) ou raser la zone à traiter		
Consignes post-traitement	- Durant la desquamation (2 semaines) : appliquer une crème réparatrice 2x/j - Ne pas frotter ni gratter la zone traitée - Ne pas retirer la peau qui pèle ni les croûtes - Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels jusqu'à disparition de l'érythème - Appliquer une crème solaire toutes les 2 heures (minimum 4x/j) - Éviter de se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna durant 48h - Ne pas se maquiller durant 1 semaine - Ne pas faire d'injection d'acide hyaluronique sur la zone traitée durant 1 semaine - Ne pas faire de traitement au laser sur la zone traitée durant 15 jours - Ne pas faire de tatouage sur la zone traitée durant 30 jours - Éviter les traitements aux rétinoïdes		
Effets indésirables	- Légers picotements / légères démangeaisons (pendant le soin) - Erythème (plus de 72h) - Desquamation - Oedème - Croûtes - Modifications de texture - Cicatrice hypertrophique - HPPI / hypopigmentation - Douleurs - Démangeaisons - Ecchymoses - Réactions allergiques cutanées locales		
Conservation	Mesopeel MD Periocular : 6 mois après ouverture (le produit peut changer de couleur au cours de sa durée de validité) Mesohyal Argibenone / Mesohyal Melilot : 1 mois au réfrigérateur soit 3 séances par patient (noter les nom et prénom du patient sur le flacon à conserver)		

DÉROULEMENT

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Disposer des dosettes de sérum physiologique à portée de main afin de pouvoir rincer rapidement et abondamment les yeux du patient en cas de contact avec l'un des produits utilisés
- Porter des gants
- Nettoyer la zone à traiter avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline : grains de beauté, verrues, coins externes et internes des yeux et sourcils

PEELING MESOPEEL MD PERIOCLAR



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 2 ml de **Mesopeel MD Perioclar** dans 2 godets en verre (1 godet/couche)

Dosage par couche : **1 ml soit 0,5ml par zone péri-oculaire**

Temps de pose de chaque couche : **3 à 5 minutes** (débuter le chronomètre dès application)

Nombre de couches : **2**

- Appliquer chaque couche de peeling avec un **coton-tige** uniformément sur les cernes et les paupières supérieures non mobiles
Frotter ou exercer une pression permet d'augmenter la profondeur d'exfoliation
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing

- **3 à 5 minutes après l'application de la dernière couche** : Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse imbibée d'eau sans appuyer ni frotter
- Neutraliser le peeling en appliquant le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse

MESOTHERAPIE MESOHYAL ARGIBENONE / MESOHYAL MELILOT



- Prélever et réinjecter la totalité de l'ampoule **Mesohyal Melilot** dans le flacon **Mesohyal Argibenone**
- Prélever **1,5ml** de préparation
- Adapter une aiguille stérile de mésothérapie au mésopen
- Régler le mésopen à **0,25mm**
- Appliquer quelques gouttes de préparation sur les cernes et les paupières supérieures non mobiles
- Effectuer la mésothérapie en tapotant le **mésopen** sur la zone à traiter : ne pas faire de griffures mais des « petits trous »
- Appliquer le reste de la préparation au **doigt** et masser jusqu'à pénétration complète