

SIGNES CLINIQUES	CONDUITE À TENIR	CONDUITE À TENIR SI AGGRAVATION OU ASSOCIATION D'UN AUTRE SIGNE CLINIQUE
URTICAIRE GÈDÈME	➡ Donner un antihistaminique au patient immédiatement : 1 comprimé Aerius 5 mg ➡ Surveiller le patient durant 30 minutes ➡ Prendre sa tension artérielle et son pouls avant son départ	➡ Faire l'injection d'Anapen 300 µg/0,3 ml : ▶ Appuyer fermement la seringue sur la face externe de la cuisse ▶ Appuyer sur le déclencheur de façon à entendre un « clic » <i>L'injection peut être pratiquée à travers des vêtements légers ou un jean.</i> ▶ Maintenir en position pendant 10 secondes ▶ Retirer lentement la seringue puis masser doucement le site d'injection ➡ Contacter immédiatement le 15 (ou le 112) ➡ Maintenir le patient allongé et lui surélever les jambes ➡ Poser une voie veineuse périphérique ➡ Prendre sa tension artérielle et son pouls
GÈNE RESPIRATOIRE URTICAIRE QUI S'ÉTEND RAPIDEMENT DOULEURS ABDOMINALES VOMISSEMENT PÂLEUR SENSATION DE MALAISE	➡ Faire l'injection d'Anapen 300 µg/0,3 ml : ▶ Appuyer fermement la seringue sur la face externe de la cuisse ▶ Appuyer sur le déclencheur de façon à entendre un « clic » <i>L'injection peut être pratiquée à travers des vêtements légers ou un jean.</i> ▶ Maintenir en position pendant 10 secondes ▶ Retirer lentement la seringue puis masser doucement le site d'injection ➡ Contacter immédiatement le 15 (ou le 112) ➡ Maintenir le patient allongé et lui surélever les jambes ➡ Poser une voie veineuse périphérique ➡ Prendre sa tension artérielle et son pouls	