

Le protocole Periocular associe l'application d'un peeling chimique superficiel Mesopeel MD Periocular et la mésothérapie de deux produits de comblement anti-âge Mesohyal Argibenone (réparation/restructuration) et Mesohyal Melilot (hydratation/nutrition).

	Mesopeel MD Periocular	Mesohyal Argibenone	Mesohyal Melilot
Composition	30% Acide glycolique 14% Acide salicylique	Acide hyaluronique Idébonone Hexapeptide	Acide hyaluronique Mélilot Troxérutine
Indications	• Hyperpigmentations péri-oculaires pigmentaires (couleur marron) ou vasculaires (couleur bleue, rose ou violette) • Signes du vieillissement de la zone péri-oculaire : rides des paupières (supérieures et inférieures) et des coins externes de l'oeil (pattes d'oeil), hyperpigmentations, cernes, relâchement, perte de densité des tissus, perte d'éclat		
Phototypes	I à VI		
Nombre de séances	3 à 5		
Intervalle	2 semaines		
Entretien	2 fois par an (tous les 6 mois)		
Contre-indications	Cf. CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES - Trouble de la coagulation / pathologie hématologique (ex : mutation du facteur V Leiden, hémophilie, thrombopénie)* - Anticoagulants (ex : Eliquis®, Coumadine®) / antiagrégants plaquettaires (ex : Plavix®, Kardegic®)* * Mésothérapie possible à la discrétion et sous la responsabilité totale du médecin du centre : un certificat du médecin spécialiste doit être demandé au patient (à conserver dans le dossier patient)		
Consignes pré-traitement	- Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels 4 à 6 semaines avant (peau complètement débronzée) - Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition - Éviter de boire de l'alcool 2 jours avant chaque peeling - Éviter de prendre des AINS (ex : ibuprofène) ou de l'aspirine 2 jours avant chaque peeling - N'appliquer aucun produit cosmétique (crème, maquillage, etc.) sur la zone à traiter le jour du peeling } Risque de saignements et d'ecchymoses		
Consignes post-traitement	- Ne pas frotter ni gratter la zone traitée - Ne pas retirer la peau qui pèle ni les croûtes - Appliquer une crème réparatrice minimum 2 fois par jour tant que la peau desquame - Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels pendant toute la durée du traitement et jusqu'à disparition complète des signes d'irritation (rougeur, chaleur, picotements, etc.) - Appliquer une crème solaire SPF 50+ chaque matin puis toutes les deux heures en cas d'exposition - Ne pas se maquiller durant la semaine suivant chaque peeling - Éviter de pratiquer une activité physique durant la semaine suivant chaque peeling - Ne pas appliquer de produits cosmétiques exfoliants (acides ou grains) ou à base d'alcool, de parfum, d'huiles essentielles, de rétinolides ou de vitamine C sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne faire aucun autre soin à domicile ou en institut sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne pas se rendre à la piscine, au hammam ou dans un sauna pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne pas épiler ou raser la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne pas faire d'injections (acide hyaluronique / botox) sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne pas faire de traitement laser ou par EBD sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Ne pas faire de tatouage sur la zone traitée pendant toute la durée du traitement et les 6 semaines suivantes - Bien s'hydrater : 1,5 à 2 L d'eau par jour		
Effets indésirables	- Douleur - Érythème - Œdème - Sensation de chaleur - Démangeaisons - Légers picotements - Desquamation - Croûtelles - Échymoses - Pétéchies - Saignements localisés - Cicatrice hypertrophique - Hyperpigmentation post-inflammatoire - Hypopigmentation - Modification de texture - Infection - Réaction allergique		
Conservation	Mesopeel MD Periocular : 6 mois après ouverture (le produit peut changer de couleur au cours de sa durée de validité) Mesohyal Argibenone / Mesohyal Melilot : 1 mois au réfrigérateur soit 3 séances par patient (noter le nom et le prénom du patient sur le flacon à conserver)		

DÉROULEMENT

- Prendre une photo de la zone à traiter avec l'accord du patient
- Demander au patient de retirer ses lentilles de contact s'il en porte et de garder les yeux fermés
- Disposer des dosettes de sérum physiologique à portée de main afin de pouvoir rincer rapidement et abondamment les yeux du patient en cas de contact avec l'un des produits utilisés
- Porter des gants
- Nettoyer la zone à traiter avec une compresse imbibée d'eau micellaire puis sécher en tapotant délicatement avec une compresse
- Protéger les zones sensibles avec de la vaseline : grains de beauté, verrues, coins externes et internes des yeux et sourcils

PEELING MESOPEEL MD PERIOCLAR



- Dévisser le bouchon du flacon lentement afin d'éviter les éclaboussures
- Prélever puis verser 1 ml de **Mesopeel MD Perioclar** dans un récipient en verre

Nombre de couche : 1

Dosage : **1 ml soit 0,5 ml par zone péri-oculaire**

Temps de pose : **3 minutes** (débuter le chronomètre dès application)

- Appliquer la couche de peeling avec un **coton-tige** uniformément sur les cernes et les paupières supérieures non mobiles
- Éventer la peau du patient pour soulager les picotements et/ou les démangeaisons si nécessaire



Si le patient ressent une gêne importante, ne pas poursuivre le soin et appliquer le spray Post-peel Neutralizing

- **3 minutes après l'application** : Rincer délicatement la zone traitée à l'aide d'une compresse imbibée d'eau sans appuyer ni frotter
- Neutraliser le peeling en appliquant le spray Post-peel Neutralizing à l'aide d'une compresse

MÉSOTHERAPIE MESOHYAL ARGIBENONE / MESOHYAL MELILOT



- Prélever et réinjecter la totalité de l'ampoule **Mesohyal Melilot** dans le flacon **Mesohyal Argibenone**
- Prélever **1,5 ml** de préparation
- Adapter une aiguille stérile de mésothérapie au mésopen
- Régler le mésopen à **0,25 mm**
- Appliquer quelques gouttes de préparation sur les cernes et les paupières supérieures non mobiles
- Effectuer la mésothérapie en tapotant le **mésopen** sur la zone à traiter : ne pas faire de griffures mais des « petits trous »
- Appliquer le reste de la préparation au **doigt** et masser jusqu'à pénétration complète