

CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES			
ÂGE		ACTES MÉDICAUX ET ESTHÉTIQUES	
À PARTIR DE 16 ANS AVEC AUTORISATION PARENTALE - Épilation laser - Laser Frax - Hair Bleaching - Lips Bleaching - Hollywood Peel - Mésothérapie - Traitement capillaire - Blemiderm		- Chirurgie récente (quelle que soit la zone opérée) : 1 mois - Tatouage / maquillage permanent ou semi-permanent sur la zone à traiter → zone à ne pas traiter durant le soin INJECTIONS SUR LA ZONE À TRAITER - Injection de comblement synthétique (ex : silicone) - Injection de botox : 2 semaines - Injection d'acide hyaluronique : 1 mois - Injection de hyaluronidase : 1 mois - Injection de collagène : 6 semaines	
À PARTIR DE 18 ANS - Détatouage - Peelings - Injection d'acide hyaluronique - Endolift		PEELINGS - Peeling chimique profond (ex : TCA > 20%, phénol) : 3 mois - Peeling chimique moyen (ex : TCA 10 - 20%, Dermamelan) : 6 semaines - Peeling chimique léger (ex : TCA < 10%, aux algues) : 3 semaines LASERS - Laser ablatif (ex : CO2) : 3 mois - Laser fractionné non ablatif (ex : laser Frax) : 3 à 6 semaines* EBD (Energy-Based Devices) : Dispositifs esthétiques non invasifs utilisant une énergie (lumière, chaleur, froid, etc.) pour agir sur la peau et les tissus (ex : lumière pulsée, radiofréquence, cryolipolyse) : 2 à 6 semaines*	
ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX			
- Grossesse / allaitement - Maladie auto-immune / pathologie immunodépressive - Cancer en cours - Antécédent de cancer¹ - Antécédent de cancer de la peau - Pathologie dermatologique sur la zone à traiter (ex : eczéma, psoriasis, rosacée) - Déficit sensoriel au niveau de la zone à traiter (toucher, chaleur, douleur) - Diabète² - Trouble de la cicatrisation (ex : chéloïde, ulcère) - Trouble psychiatrique sévère - Fièvre (température > 38,5°C) - Allergie à l'un des composants			
TRAITEMENTS		PRODUITS COSMÉTIQUES SUR LA ZONE À TRAITER	
MÉDICAMENTS - Immunosuppresseurs - Chrysothérapie (sels d'or) - Dermatologiques sensibilisants : - Isotrétinoïne (Roaccutane®) : 6 mois - Cyclines (ex : doxycycline, tétracycline) : 2 semaines - Corticoïdes oraux plus de 10 jours (ex : Cortancyl®) : 2 à 4 semaines* CRÈMES - Corticoïdes topiques (ex : Diprosone®) : 1 à 2 semaines* quelle que soit la zone d'application³ - Rétinoïdes topiques (ex : trétinoïne) : 1 semaine quelle que soit la zone d'application - Antibiotiques topiques (ex : Fucidine®) : 3 jours		- Gommage : 1 semaine sauf indication contraire - À base d'acides exfoliants (ex : AHA, BHA, PHA) : 1 semaine - À base d'alcool : 1 semaine - À base de parfum : 1 semaine - À base de rétinoïdes (ex : rétinol, rétinol, vitamine A) : 1 semaine - À base de vitamine C : 1 semaine - Huiles essentielles : 2 semaines - Crème autobronzante : 2 semaines (spray tan : 4 semaines recommandées) - Crèmes éclaircissantes puissantes (ex : hydroquinone, acides dépigmentants) : 4 semaines	
		ÉPILATION / RASAGE / TEINTURE / DÉCOLORATION	
		- Épilation : 10 jours - Rasage : 3 jours - Teinture : 1 semaine - Décoloration : 1 semaine sauf indication contraire ✂️ ÉPILATION LASER : rasage la veille (épilation / décoloration : 1 mois)	
ÉTAT CUTANÉ		EXPOSITIONS SOLAIRES / À LA CHALEUR	
- Peau irritée ou lésée sur la zone à traiter - Infection virale (ex : herpès), bactérienne (ex : impétigo) ou fongique (ex : mycose) sur la zone à traiter - Cicatrice chirurgicale ou traumatique : 3 mois (si non inflammatoire) - Grain de beauté pré-cancéreux ou suspect / lésion suspecte - Grain de beauté volumineux → zone à ne pas traiter durant le soin - Verrue → zone à ne pas traiter durant le soin		- Soleil / UV artificiels : - Peelings : peau complètement débronzée - Lasers : selon la longueur d'onde utilisée - Autres soins : 2 semaines - Sauna / hammam : 3 jours - Piscine (chaleur / chlore) : 3 jours	

CONTRE-INDICATIONS AU LASER : ÉPILATION / LASER FRAX / DÉTATOUAGE / HAIR BLEACHING / LIPS BLEACHING / HOLLYWOOD PEEL
LES CONTRE-INDICATIONS SUIVANTES SONT À AJOUTER AUX CONTRE-INDICATIONS GÉNÉRALES

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX	TRAITEMENTS
• Photosensibilité cutanée, oculaire³ ou neurologique (ex : porphyrie, épilepsie) • Trouble de la coagulation / pathologie hématologique (ex : mutation du facteur V Leiden, hémophilie, thrombopénie)² • Pacemaker / défibrillateur • Implant superficiel sur la zone à traiter	• PHOTSENSIBILISANTS : - Médicaments : cf. protocole ci-dessous - Crèmes anti-inflammatoires (ex : kétoprofène gel) sur la zone à traiter : 1 semaine - Compléments alimentaires aux extraits végétaux (ex : millepertuis, bergamote, pamplemousse) ou à base de vitamines photosensibilisantes (ex : vitamine A, vitamine B6) : 1 mois • Anticoagulants (ex : Eliquis®, Coumadine®) / antiagrégants plaquettaires (ex : Plavix®, Kardegic®) • Compléments alimentaires susceptibles de colorer la peau (ex : bêta-carotène, lycopène) : 1 mois

¹ Acte possible à la discrétion et sous la responsabilité totale du médecin du centre :
- le cancer doit être guéri depuis plus de 5 ans
- un certificat de l'oncologue doit être demandé au patient (à conserver dans le dossier patient)

² Acte possible à la discrétion et sous la responsabilité totale du médecin du centre :
- un test sur une petite zone doit être fait au minimum 48h avant la première séance
- un certificat du médecin spécialiste doit être demandé au patient (à conserver dans le dossier patient)

³ Photosensibilité oculaire : Laser possible à la discrétion et sous la responsabilité totale du médecin du centre :

- un certificat du médecin spécialiste doit être demandé au patient (à conserver dans le dossier patient)
- le patient devra porter des coques de protection à chaque séance, quelle que soit la longueur d'onde utilisée

* Délai le plus court : épilation laser / électrolyse / mésothérapie / traitement capillaire / Hollywood Peel

Délai le plus long : peelings / détatouage / Lips Bleaching / Hair Bleaching

PROTOCOLE TRAITEMENT

